

VALDOXAN®

Zalecenia jak zminimalizować występowanie działań niepożądanych dotyczących wątroby

Valdoxan może powodować działania niepożądane, w tym zmiany czynności wątroby.

Ta broszura zawiera zalecenia, jak unikać występowania działań niepożądanych dotyczących wątroby oraz poradę, co należy zrobić, jeśli podczas leczenia lekiem Valdoxan wystąpią tego typu działania niepożądane.

Należy poprosić lekarza o udzielenie dalszych informacji.

Valdoxan jest lekiem przeciwdepresyjnym, który pomaga leczyć depresję.

Aby zoptymalizować leczenie, należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących leczenia lekiem Valdoxan (dawka, czas trwania terapii, ustalenie terminów wizyt, ocena badań krwi).

CO NALEŻY ZROBIĆ PRZED PRZYJĘCIEM LEKU VALDOXAN?

- **Jeśli pacjent wie, że jego wątroba nie pracuje prawidłowo, powinien powiedzieć o tym lekarzowi: w takim przypadku nie należy przyjmować leku Valdoxan.**

- **Mogą istnieć inne przyczyny, z powodu których lek Valdoxan nie jest odpowiedni dla pacjenta.**

Proszę zwrócić się po poradę do lekarza w następujących sytuacjach:

- jeśli pacjent kiedykolwiek miał zaburzenia czynności wątroby,
- jeśli pacjent jest otyły lub ma nadwagę,
- jeśli pacjent ma cukrzycę,
- jeśli pacjent spożywa alkohol,
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki (o których wiadomo, że działają na wątrobę).

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY PODCZAS LECZENIA UNIKNĄĆ ZABURZEŃ CZYNNOŚCI WĄTROBY?

➤ **Należy regularnie wykonywać badania krwi**

- **Dlaczego?**

Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien sprawdzić, czy **wątroba pacjenta pracuje prawidłowo**. Wykażą to zalecone przez lekarza **badania krwi** i lekarz zadecyduje, czy Valdoxan jest odpowiednim lekiem dla pacjenta.

Podczas leczenia lekiem Valdoxan u niektórych pacjentów może się zwiększyć aktywność enzymów wątrobowych we krwi. Aktywność tych enzymów wskazuje na prawidłową lub nieprawidłową czynność wątroby oraz jest istotna dla lekarza do monitorowania leczenia.

- **Kiedy?**

	Przed rozpoczęciem leczenia lub zwiększeniem dawki	Po około 3 tygodniach	Po około 6 tygodniach	Po około 3 miesiącach	Po około 6 miesiącach
Badania krwi	✓	✓	✓	✓	✓

Badania należy ponownie przeprowadzić, gdy lekarz zwiększy dawkę do 50 mg.

Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą na wizytę do lekarza

ROZKŁAD PLANOWANYCH BADAŃ KRWI

(patrz następna strona)

Jeśli pacjent dowie się, że podczas leczenia zwiększyła się aktywność enzymów wątrobowych we krwi, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

➤ **Należy zachować czujność odnośnie objawów zaburzenia czynności wątroby**
Jeśli pacjent zaobserwuje którykolwiek z następujących objawów świadczących o tym, że wątroba może pracować nieprawidłowo:

- zażółcenie skóry lub oczu,
- ciemno zabarwiony mocz,
- jasny stolec,
- ból w prawej górnej części brzucha,
- nietypowe zmęczenie (zwłaszcza związane z innymi objawami wymienionymi powyżej).

⇒ Należy natychmiast zwrócić się po poradę do lekarza, który może zalecić przerwanie przyjmowania leku Valdoxan.

ROZKŁAD PLANOWANYCH BADAŃ KRWI

NALEŻY PAMIĘTAĆ

Ważne jest, aby podczas przyjmowania leku Valdoxan regularnie wykonywać badania krwi.

PONIŻSZA TABELA POMOŻE PAMIĘTAĆ O TERMINACH BADAŃ KRWI.

VALDOXAN 25 mg – DATA PIERWSZEGO PRZYJĘCIA LEKU:	
Przerwy między badaniami poziomów enzymów wątrobowych we krwi	Data
Data pierwszego badania <i>(na początku)</i>	
Data drugiego badania <i>(po około 3 tygodniach)</i>	
Data trzeciego badania <i>(po około 6 tygodniach)</i>	
Data czwartego badania <i>(po około 3 miesiącach)</i>	
Data piątego badania <i>(po około 6 miesiącach)</i>	

Lekarz może zdecydować, że należy przeprowadzić dalsze badania krwi.

ZWIĘKSZENIE DAWKI DO 50 mg – DATA PIERWSZEGO PRZYJĘCIA LEKU:	
Przerwy między badaniami poziomów enzymów wątrobowych we krwi	Data
Data badania na początku leczenia lekiem Valdoxan w dawce 50 mg	
Data drugiego badania <i>(po około 3 tygodniach)</i>	
Data trzeciego badania <i>(po około 6 tygodniach)</i>	
Data czwartego badania <i>(po około 3 miesiącach)</i>	
Data piątego badania <i>(po około 6 miesiącach)</i>	

Lekarz może zdecydować, że należy przeprowadzić dalsze badania krwi.

Należy pamiętać, aby w przypadku wizyty u lekarza zabrać tę broszurę ze sobą.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zapoznać się z ulotką leku Valdoxan załączoną do opakowania.

