

# ВАЛЬДОКСАН

## Рекомендації як запобігти виникненню побічних ефектів з боку печінки

**Вальдоксан може викликати побічні ефекти, включно зміни функції печінки.**

**Ця брошура містить рекомендації про те, як запобігти виникненню побічних ефектів з боку печінки, і поради про те, що робити, у разі виникнення цих побічних ефектів під час лікування Вальдоксаном.**

**Попросіть свого лікаря надати додаткову інформацію.**

Вальдоксан - антидепресант, який допомагає лікувати депресію.

Для оптимізації лікування необхідно дотримуватися рекомендацій лікаря щодо лікування препаратом Вальдоксан (дозування, тривалість терапії, дотримання схеми (розкладу) візитів та схеми (розкладу) проведення досліджень крові)

В Україні лікарський засіб Вальдоксан 25 мг (Valdoxan 25 mg) зареєстровано під торговою назвою Мелітор® (РП № UA/4972/01/01)

## **ЩО РОБИТИ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ВАЛЬДОКСАНА?**

- **Якщо ви знаєте, що ваша печінка не працює належним чином, ви повинні повідомити про це свого лікаря: в цьому випадку не можна приймати Вальдоксан.**
- **Можуть бути й інші причини, через які препарат Вальдоксан не підходить для вас.**

Будь ласка, зверніться за порадою до лікаря в наступних ситуаціях:

- якщо у вас коли-небудь були порушення функції печінки (печінка не працювала належним чином),
- якщо ви страждаєте на ожиріння або маєте надлишкову вагу,
- якщо у вас діабет,
- якщо ви вживає алкоголь,
- якщо ви приймає інші ліки (які порушують функцію печінки).

## **ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ УНИКНУТИ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ?**

### **➤ Необхідно регулярно робити дослідження крові**

#### **• Чому?**

Перед початком лікування лікар повинен перевірити, чи **правильно працює печінка пацієнта**. Результати дослідження крові, яке було призначено вашим лікарем, допоможе лікарю зробити висновок чи підходить вам Вальдоксан.

Під час лікування Вальдоксаном у деяких пацієнтів може підвищуватися активність печінкових ферментів у крові. Активність цих ферментів вказує на нормальну або порушену функцію печінки і має важливе значення для лікаря для моніторингу лікування.

#### **• Коли?**

	Перед початком лікування або збільшенням дози	приблизно через 3 тижні	приблизно через 6 тижнів	приблизно через 3 місяці	приблизно через 6 місяців
Аналізи крові	✓	✓	✓	✓	✓

**Якщо ваш лікар має намір збільшити дозу до 50 мг, необхідно знову провести печінкові тести з тією ж частотою.**

Не забудьте взяти з собою на прийом до лікаря  
**РОЗКЛАД ЗАПЛАНОВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРОВІ**  
(див. наступну сторінку)

Якщо пацієнт дізнається, що під час лікування підвищується активність ферментів печінки в крові, має негайно повідомити про це лікаря.

### **➤ Будьте уважні щодо симптомів, які вказують на порушення функції печінки**

**Якщо ви спостерігаєте будь-який з наступних симптомів, вірогідно ваша печінка не працює належним чином:**

- пожовтіння шкіри або очей,
- темний колір сечі,
- випорожнення світлого кольору (світло забарвлений кал ),
- біль у правій верхній частині живота,
- незвична втома (особливо разом з іншими симптомами, згаданими вище).

**В Україні лікарський засіб Вальдоксан 25 мг (Valdoxan 25 mg) зареєстровано під торговою назвою Мелітор® (РП № UA/4972/01/01)**

⇒ Негайно зверніться за порадою до лікаря, який може порадити припинити застосування Вальдоксану.

В Україні лікарський засіб Вальдоксан 25 мг (Valdoxan 25 mg) зареєстровано під торговою назвою Мелітор® (РП № UA/4972/01/01)

## РОЗКЛАД ЗАПЛАНОВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРОВІ

### ПАМ'ЯТАЙТЕ

При застосуванні препарату Вальдоксан, важливо регулярно робити дослідження крові.

ТАБЛИЦЯ НИЖЧЕ ДОПОМОЖЕ ПАМ'ЯТАТИ ПРО ДАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ.

<b>ВАЛЬДОКСАН 25 мг - ДАТА ПЕРШОГО ПРИЙОМУ ПРЕПАРАТУ:</b>	
<b>Перерви між дослідженнями рівня ферментів печінки в крові</b>	<b>Дата</b>
Дата першого аналізу <i>(спочатку)</i>	
Дата другого аналізу <i>(приблизно через 3 тижні)</i>	
Дата третього аналізу <i>(приблизно через 6 тижнів)</i>	
Дата четвертого аналізу <i>(приблизно через 3 місяці)</i>	
Дата п'ятого аналізу <i>(приблизно через 6 місяців)</i>	

Лікар може вирішити, що вам потрібно провести додаткові аналізи крові.

<b>ЗБІЛЬШЕННЯ ДОЗИ ДО 50 мг – ДАТА ПЕРШОГО ПРИЙОМУ ПРЕПАРАТУ:</b>	
<b>Перерви між дослідженнями рівня ферментів печінки в крові</b>	<b>Дата</b>
Дата дослідження до початку лікування Вальдоксаном у дозі 50 мг	
Дата другого аналізу <i>(приблизно через 3 тижні)</i>	
Дата третього аналізу <i>(приблизно через 6 тижнів)</i>	
Дата четвертого аналізу <i>(приблизно через 3 місяці)</i>	
Дата п'ятого аналізу <i>(приблизно через 6 місяців)</i>	

Лікар може вирішити, що вам потрібно провести додаткові аналізи крові.

Не забудьте взяти цю брошуру з собою, якщо ви відвідуєте лікаря.

**В Україні лікарський засіб Вальдоксан 25 мг (Valdoxan 25 mg) зареєстровано під торговою назвою Мелітор® (РП № UA/4972/01/01)**

*Для отримання більш детальної інформації необхідно ознайомитись з листком-вкладішем Вальдоксан, який знаходиться в упаковці.*