

Схема моніторингу функції печінки при застосуванні Вальдоксану (в Україні Мелітор)

Вальдоксан 25 мг (Мелітор)

- До початку лікування дозою 25 мг
АЛТ.....Од/л
АСТ.....Од/л
- Тиждень 3
АЛТ Од/л
АСТОд/л
- Тиждень 6
АЛТ Од/л
АСТОд/л
- Тиждень 12
АЛТ Од/л
АСТОд/л
- Тиждень 24
АЛТ Од/л
АСТОд/л

Дослідження повинно проводитися в будь-який час при наявності клінічних показань

- При збільшенні дози до 50 мг необхідно знову провести печінкові тести з тією ж частотою

- Початок лікування дозою 50 мг
АЛТ..... Од/л
АСТОд/л
- Тиждень 3
АЛТ Од/л
АСТОд/л
- Тиждень 6
АЛТ Од/л
АСТОд/л
- Тиждень 12
АЛТ Од/л
АСТОд/л
- Тиждень 24
АЛТ Од/л
АСТОд/л

Дослідження повинно проводитися в будь-який час при наявності клінічних показань

Персональні дані пацієнта: _____

Дата початку: _____

Симптоми або ознаки потенційного порушення функції печінки*

Рівень сироваткових трансаміназ (АЛТ, АСТ)

АЛТ та/або АСТ > 3-кратне підвищення значення верхньої межі норми

АЛТ та/або АСТ ≤ 3-кратне підвищення значення верхньої межі норми

В нормі

Симптоми або ознаки потенційного порушення функції печінки*

Немає симптомів або ознак порушення функції печінки
Повторіть тести функції печінки впродовж 48 годин

АЛТ та/або АСТ > 3-кратне підвищення значення верхньої межі норми

АЛТ та/або АСТ ≤ 3-кратне підвищення значення верхньої межі норми

- Припинити лікування**
- Повинні бути проведено тестування функції печінки (включно визначення трансаміназ)

- Припинити лікування**
- Дослідження функції печінки слід регулярно повторювати, доки показники сироваткових трансаміназ не нормалізуються.

- Продовжити лікування**
- Слід дотримуватися схеми моніторингу функції печінки

* такі як темна сеча, випорожнення світлого кольору, пожовтіння шкіри/очей, біль у верхній правій частині живота, нові випадки виникнення тривалої втоми нез'ясованої етіології.