

Schemat monitorowania czynności wątroby podczas stosowania leku Valdoxan

Valdoxan 25 mg

Przed rozpoczęciem leczenia dawką 25 mg

AIAT U/l

AspAT U/l

Tydzień 3

AIAT U/l

AspAT U/l

Tydzień 6

AIAT U/l

AspAT U/l

Tydzień 12

AIAT U/l

AspAT U/l

Tydzień 24

AIAT U/l

AspAT U/l

Należy przeprowadzić badanie w dowolnym czasie, jeśli jest to klinicznie wskazane.

W przypadku zwiększenia dawki **do 50 mg** należy ponownie zastosować schemat monitorowania

Rozpoczęcie leczenia dawką 50 mg

AIAT U/l

AspAT U/l

Tydzień 3

AIAT U/l

AspAT U/l

Tydzień 6

AIAT U/l

AspAT U/l

Tydzień 12

AIAT U/l

AspAT U/l

Tydzień 24


AIAT U/l

AspAT U/l

Należy przeprowadzić badanie w dowolnym czasie, jeśli jest to klinicznie wskazane.

Dane osobowe pacjenta: _____

Data rozpoczęcia: _____



* takie jak ciemne zabarwienie moczu, jasne zabarwienie stolca, zażółcenie skóry/oczu, ból w prawej górnej części brzucha, utrzymujące się nowo powstałe i niewyjaśnione zmęczenie