

## ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА — ГОСТРИЙ МІЄЛОЇДНИЙ ЛЕЙКОЗ

Тібсово, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг  
івосиденіб

**Інформація для пацієнта, який проходить лікування гострого мієлоїдного лейкозу**

**Ця Пам'ятка для пацієнта містить важливу інформацію про Тібсово для Вас і для працівників сфери охорони здоров'я.**

- Постійно носіть цю пам'ятку з собою.
- Повідомте лікарю, фармацевту або медсестрі про те, що ви приймаєте препарат Тібсово.
- Якщо у Вас з'явився будь-який з перерахованих нижче симптомів, негайно зверніться до працівника сфери охорони здоров'я та покажіть йому Пам'ятку для пацієнта.
- Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію цієї пам'ятки. Остання версія Пам'ятки – це та, яка знаходилась в упаковці Тібсово, яку Ви в останнє використовували.

### **Про лікування**

- Препарат Тібсово застосовується для лікування дорослих пацієнтів з гострим мієлоїдним лейкозом (ГМЛ) і призначається у комбінації з азацитидином (іншим протираковим препаратом). Тібсово призначається лише пацієнтам, у яких ГМЛ спричинений зміною (мутацією) білка ІДГ1.
- Препарат Тібсово може викликати **серйозні побічні реакції**, включаючи серйозний стан, відомий як **диференціувальний синдром**.
- Якщо не проводити лікування диференціувального синдрому, він може бути небезпечним для життя.
- Диференціувальний синдром у пацієнтів з ГМЛ виникав у період до 46 днів після початку лікування.

**Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо у вас виникне будь-який з таких симптомів диференціувального синдрому:**

- лихоманка
- кашель
- труднощі з диханням
- висип
- зниження виділення сечі
- запаморочення або переднепритомний стан
- швидке збільшення маси тіла
- набряк рук або ніг

**Детальна інформація міститься в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу Тібсово.**

## **Інформація для працівників сфери охорони здоров'я**

- У пацієнтів, які отримували препарат Тібсово, виникав диференціувальний синдром, який за відсутності лікування може бути небезпечним для життя або призвести до летального наслідку.
- Диференціувальний синдром у пацієнтів з ГМЛ виникав у період до 46 днів після початку лікування.
- Диференціувальний синдром пов'язаний зі швидкою проліферацією та диференціуванням мієлоїдних клітин.

Симптоми включають:

неінфекційний лейкоцитоз, периферичний набряк, пірексію, задишку, плевральний випіт, артеріальну гіпотензію, гіпоксію, набряк легень, пневмоніт, перикардіальний випіт, висипання, гіперволемію, синдром лізису пухлини та підвищення рівня креатиніну.

- Якщо виникає підозра на розвиток диференціувального синдрому, слід розпочати лікування системними кортикостероїдами та проводити моніторинг гемодинамічних показників до зникнення симптомів та ще протягом мінімум 3 днів.

**Детальна інформація стосовно препарату Тібсово міститься в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу.**

### **Заповніть цей розділ**

Ім'я пацієнта: \_\_\_\_\_

Дата народження: \_\_\_\_\_

Дата початку застосування препарату Тібсово та доза: \_\_\_\_\_

Лікар, який призначив препарат / контактна особа для надання екстреної медичної допомоги: \_\_\_\_\_